

R8 梅防除暦変更点まとめ

1. 1月中旬

【備考欄】「病害虫の発生のない地域では散布しない。」を追加

2. 幼果期（4月中旬）と肥大期（4月下旬）の間へ文章挿入

【本欄】「青果用小梅では、マイコシールドの収穫前日数に注意する。」を追加

3. クビアカツヤカミキリ防除

- ・一斎防除の回数を2回から3回へ変更

4. 一斎防除（6月下旬）

【本欄】

- ・「6月中下旬」から「6月下旬」に変更

・「ダントツ水溶剤」から「モスピラン顆粒水溶剤^⑩ 2,000倍（前日迄/3回）」へ変更

【備考】「モスピラン顆粒水溶剤^⑩にかえてダントツ水溶剤 2,000倍（前日迄/3回以内）でもよい。」を追加

5. 一斎防除（7月上旬）

【本欄】「7月上中旬」から「7月上旬」に変更

6. 一斎防除（7月下旬）

【防除時期】「一斎防除（7月下旬）」を追加

【本欄】「モスピラン顆粒水溶剤^⑩ 2,000倍（前日迄/3回以内）」を追加

【備考】「モスピラン顆粒水溶剤^⑩にかえてダントツ水溶剤 2,000倍（前日迄/3回以内）でもよい。」を追加

7. 特殊防除 4月上旬

【コスカシバ】「発芽期（4月上旬）スカシバコンL」を、「備考」から「特殊防除」へ移動

8. 特殊防除 収穫後（9月中旬）

【コスカシバ】フェニックスフルアブル 200倍（開花期迄/1回）を追加

※除草剤欄が追加されています。