

R8 平核無柿防除暦変更点まとめ

1. 萌芽直前（3月上旬）

【対象病害虫】「カイガラムシ類」から、「カイガラムシ類幼虫」に変更

【使用基準】「45日前」から「開花期迄」に変更

2. 5月下旬～6月上旬

【適用病害虫】「カンザワハダニ」を削除し、「カメムシ類」を追加

【防除法】「コテツフロアブル 2,000倍」から、「キラップフロアブル 2,000倍」に変更

【使用基準】「14日前迄・2回以内」を削除し、「7日前迄/2回以内」を追加

【備考】「カンザワハダニ多発園では、キラップフロアブルに替えてコテツフロアブル 2,000倍（14日前迄/2回以内）を散布する。」を追加

3. 6月中下旬

【防除法】「ペンコゼブ水和剤 600倍」から、「キノンド一顆粒水和剤 1,000倍」に変更

【使用基準】「45日前迄/2回以内」を削除し、「14日前迄/5回以内」を追加

【備考】「果実黒変果軽減のため、カルシウム剤 1,000倍を散布する」を追加

4. 7月上旬

【防除法】「エムダイファー水和剤 600倍」から、「ペンコゼブ水和剤 600倍」に変更

【備考】

・「ペンコゼブ水和剤に替えて、エムダイファー水和剤 600倍（45日前迄/2回以内）（令和8年10月登録失効）でもよい。」を追加

・「カメムシ発生園ではキラップフロアブル 2,000倍（7日前迄/2回以内）を散布する。」を削除

5. 7月下旬～8月上旬

【対象病害虫】「炭そ病」を削除

※除草剤欄が追加されています。